



¿Cuáles son los diferentes tipos de esclerosis múltiple?

Remitente recurrente

Este es el tipo más común de esclerosis múltiple; aproximadamente el 85% de las personas inicialmente reciben un diagnóstico de esclerosis múltiple recurrente remitente. Los síntomas se intensifican durante un período de tiempo y luego desaparecen. La mayoría de las personas se recupera total o parcialmente cuando terminan los brotes de síntomas. Durante los períodos sin síntomas, ninguna discapacidad relacionada empeora.

Secundaria progresiva

Después de experimentar niveles relativamente estables de discapacidad entre brotes de síntomas, muchas personas con esclerosis múltiple recurrente remitente podrían desarrollar esclerosis múltiple secundaria progresiva y empezar a ver que sus síntomas y períodos entre brotes empeoran. Las personas con este tipo de esclerosis múltiple podrían experimentar brotes de síntomas más debilitantes. Es posible que no se recuperen de estos brotes, o que su discapacidad empeore incluso cuando no estén teniendo brotes de la enfermedad.

Primaria progresiva

Un pequeño porcentaje de personas con esclerosis múltiple, aproximadamente entre el 10% y el 15%, tienen esclerosis múltiple progresiva primaria. Sienten que sus síntomas empeoran desde el principio, generalmente sin brotes de la enfermedad.

FUENTE: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cardiovasculares
