

CÓMO RECONOCER LAS SEÑALES DE UNA SOBREDOSIS.



NO RESPONDE



RESPIRACIÓN
IRREGULAR



PIEL DE COLOR
GRIS, AZUL
O PÁLIDA



PUPILAS MUY
PEQUEÑAS

CÓMO REVERTIR UNA SOBREDOSIS.

¡La acción inmediata salva vidas! Las leyes del Buen Samaritano lo protegen cuando intenta ayudar a alguien que lo necesita.

LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE

Llame al 911 o indique a alguien cercano que llame y diga que está brindando apoyo ante una supuesta sobredosis.



ADMINISTRE NALOXONA

Aunque la persona no responda, 1) anuncie que va a administrar naloxona; 2) rocíe la naloxona en la nariz de la persona.



HAGA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (CPR)

Incline la cabeza de la persona hacia atrás para asegurarse de que las vías respiratorias estén abiertas.

Realice compresiones torácicas.



VUELVA A ADMINISTRAR NALOXONA

Administre naloxona adicional si la persona no recupera el color o la respiración; de lo contrario, continúe con las compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda.



MANTÉNGASE CALMADO Y TRANQUILO

Si la persona es reanimada, manténgase calmado y compasivo, y animela a aceptar ayuda o permanecer en un lugar público.



La reducción del daño (en inglés Harm Reduction) tiene por objeto mantener a las personas seguras de una manera práctica. **Consejos simples:**

LLEVE NALOXONA | NUNCA USE DROGAS SOLO | VAYA LENTO | ANALICE SUS DROGAS

HAGA UNA PRUEBA DE FENTANILO A SUS DROGAS.



RESULTADO POSITIVO
DE FENTANILO



TENGA CUIDADO



LAS TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO SE PUEDEN USAR PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE FENTANILO EN SU SUSTANCIA.⁵

Incluso si sus drogas dan negativo en la prueba de fentanilo, tenga cuidado y recuerde los pasos a seguir para reducir el daño.



Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse, NIDA)
Iniciativa de difusión de la Red de Ensayos Clínicos (Clinical Trials Network, CTN)



Centro de Medicina y
Política para Adicciones